

日期：

親愛的家長／看顧人：

您子女班上有位同學已被診斷患上鏈球菌喉炎（strep throat）。並非所有咽喉痛是由鏈球菌引起，但咽喉痛若真被鏈球菌感染引起，則必須在醫生指導下用抗生素治療一段時間，以免併發症產生。

**病徵：**A 群鏈球菌能引致咽喉痛、發燒、腹痛、頭痛、頸部淋巴腺腫脹及食慾不振。當病者咽喉發炎，並出現呈細緻紅色斑點、和摸起來似沙紙的皮疹時，那麼病者患的是猩紅熱，出現的皮疹不會令病情惡化。

**潛伏期：**發病後的二到五天。

**治療咽喉痛及皮疹的方法：**如果子女出現嚴重咽喉痛並伴有皮疹，或嚴重咽喉痛已持續超過 24 小時，而症狀卻又與感冒症狀無關，則子女必須由專業醫護人員診斷是否患上鏈球菌喉炎。醫護人員會做細菌培養“throat culture”，檢驗咽喉是否感染鏈球菌。一旦驗出被感染，醫生就會開抗生素治療。

**隔離期限：**病童在使用抗生素 24 小時後，不再有傳染性。若病童在使用抗生素治療後 24 小時，病情有好轉，便可返校。

**傳染途徑：**鏈球菌經由直接接觸病患、或帶菌者的呼吸道飛沫傳染。勤洗手能預防疾病進一步擴散。

如有更多問題，請致電您子女的醫護人員。